POBLACIÓN	INDICACIONES	F.F.	COMPARADOR	INDICACIÓN INFORME ETS	DIGEMID L.C. (INCLUIDO NO INCLUIDO EXCLUIDO)	FECHA DIGEMID	Enlace_DIGEMID	IETSI DESDE	FECHA IETSI	LINK	RENETSA DESDE	FECHA RENETSA	LINK
pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama HR+/HER2- avanzado o metastásico y progresión a terapia previa con inhibidores de aromatasa	ABEMACICLIB 150 mg	Tableta	Inhibidor de aromatasa	EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT PARA EL TRATAMIENDO DE MUJERES POST MENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO CON RH (+) Y HER2 (-), COMO TERAPIA ENCDOCIRNA INICIAL O DESPUÉS DE LA PROGRESIÓN CON TERAPIA PREVIA	NO APROBADO	Jun-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/10/1122700/ets-007-2020-fulvestrant-para-ca-mama-metastasico.pdf	NO EVALUADO					
Tratamiento de paciente con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCPRC)	ABIRATERONA 250 mg	Tableta	Placebo + prednisona (PL+PRE) o Enzalutamida (ENZ)	TRATAMIENTO DE PACIENTE CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN, SIN TRATAMIENTO PREVIO DE QUIMIOTERAPIA	NO CONCLUYENTE	Dic-18	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/01/970076/ets-015-2018-abiraterona.pdf	APROBADO	May-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/Dictamen_031_acetato_abirateron_prostata_pre_qx.pdf			
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN, CON PROGRESIÓN, CONTRAINDICACIÓN O INTOLERANCIA AL DOCECTAXEK	ABIRATERONA 250 mg	Tableta	Placebo	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN, CON PROGRESIÓN, CONTRAINDICACIÓN O INTOLERANCIA AL DOCECTAXEK	NO EVALUADO			APROBADO	Jun-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/dictamen_036_acetato_post.pdf			
Tratamiento de tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo	ACETATO DE LANREOTIDE 120 mg	solución inyectable en jeringa precargada	Octreotide	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TUMORES NEUROENDOCRINOS DE ORIGEN GASTROENTEROPANCREÁTICOS DE GADRO 1 Y UN SUBGRUPO GRADO 2 (KI67 HASTA 10%) O TUMOR PRIMARIO DE ORIGEN DESCONOCIDO, DONDE SE HAN EXCLUIDO LOS LUGARES DE ORIGEN NO INTESTINAL, CON ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANAZADO IRRESECABLES O METASTÁSICA	NO EVALUADO			NO APROBADO	Feb-19	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_008_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019_compressed.pdf			
Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado* o metastásico, con mutaciones activadoras del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico**, con contraindicación a erlotinib por hipersensibilidad	AFATINIB 40 mg	Comprimidos	Quimioterapia	COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, CON MUTACIONES ACTIVADORAS DEL GEN DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRCIMIENTO EPIDÉRMICO, CON CONTRAINDICACIÓN A ERLOTINIB POR HIPERSENSIBILIDAD	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/356	APROBADO	Dic-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116868/dict-n-055-2019-afatinib-cpcnp-final.pdf			
Paciente adulto con diagnóstico de cáncer de pulmón de células nopequeñas ALK-positivo metastásico sin tratamiento sistémico previo (en enfermedad metastásica)	ALECTINIB 150 mg	Cápsula	Quimioterapia basada en platino	TRATAMIENDO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) METASTÁSICO POSITIVO PARA EL RE ARREGLO DE LA CINASA DEL LINFOMA ANAPLASICO (ALK)	NO APROBADO			NO APROBADO	Feb-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1361886/dict-n-009-2019-alectinib-nsclc-final.pdf			
PACIENTES VARONES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTES A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO	APALUTAMIDA 60 mg	Tableta	Terapia de privación de andrógenos (ADT)	TRATAMIENTO DE PACIENTES VARONES CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTES A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO, COON TIEMPO DE DOBLAJE DE PSA MENOR O IGUAL A 10 MESES	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357718/dict-35dets2021documento-ad-hoc-apalutamida-enzalutamida.pdf			
Pacientes adultos con carcinoma hepatocelular no resecable o metastásico	ATEZOLIZUMAB + BEVACIZUMAB 1200 mg + 15 mg / kg	Concentrado para solución para perfusión	Sorafenib	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA CELULAR CON ENFERMEDAD INOPERABLE O METASTÁSICA SIN TRATAMIENTO SISTÉMICO PREVIO	APROBADO			APROBADO	set-2022	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/DICT.-035-DETS-2022.pdf			
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS EN ESTADIO AVANZADO (CPCP-EE)	ATEZOLIZUMAB 1200 mg / 20 mL	Inyectable		TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO O CISPLATINO MÁS ETOPOSIDO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS EN ESTADIO AVANZADO (CPCP-EE)	NO APROBADO		http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/351	NO EVALUADO					
Pacientes adultos con cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP), metastásico, sin mutaciones de los genes EGFR o ALK, que progresaron a la primera línea de tratamiento con quimioterapia basada en platino	ATEZOLIZUMAB 1200 mg / 20 mL	Inyectable	quimioterapia	COMO SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS METASTÁSICO, CON PDL2 ≥ 1%, QUE PROGRESARON A UNA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA SOLA	NO EVALUADO			NO APROBADO	set-2022	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/DICT.-034-DETS-2022.pdf			
CPNCP etapa IV confirmado por histología o citología, sin mutaciones de EGFR ni translocación de ALK, sin tratamiento previo para enfermedad metastásica, en ECOG 0-1, al menos una lesión medible por RECIST, y un score de expresión de PDL1 de al menos 50% en la biopsia	ATEZOLIZUMAB 1200 mg / 20 ml	Inyectable	Quimioterapia a elección del investigador (carboplatino + pemetrexato, cisplatino + pemetrexato, cisplatino + pemetrexato, carboplatino + gemcitabina o carboplatino + paclitaxel), hasta un máximo de 4-6 ciclos. Pemetrexato sólo se usó en histología no escamosa; se permitía quimioterapia de mantención en dichos pacientes	Análisis de costo efectividad para Atezolizumab y Pembrolizumab en monoterapia para el tratamiendo en primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, sin expresión tipo EGFR o ALK y cuyos tumores expresen PD-L1≥50%	NO APROBADO			NO APROBADO	dicembre-2017	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/01/966203/059-pembrolizumab.pdf			

Pacientes adultos portadores de CPNCP avanzado, con progresión medida por RECIST después de dos o más ciclos de quimioterapia de primera línea basada en platino (como asimismo un inhibidor de tirosina kinasa adecuado para aquellos con mutaciones de EGFR o rearreglo de ALK). Debían tener enfermedad medible, ECOG 0-1, una muestra de tumor para análisis, y expresión de PD-L1 en al menos 1% de las células tumorales.	ATEZOLIZUMAB 1200 mg / 20 ml	Inyectable	Docetaxel 75 mg/m2 ev cada 3 semanas.	Análisis de costo efectividad para Atezolizumab, Pembrolizumab o Nivolumab inyectable como segunda línea de tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, con PDL1, que progresaron a una primera línea de tratamiento con quimioterapia sola	NO APROBADO			NO APROBADO	set-2022	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/DICT.-034-DETS-2022.pdf			
Síndrome Mielodisplásico de bajo riesgo o intermedio-I	AZACITIDINA 100 mg	Inyectable	Terapia de soporte	TRATAMIENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE BAJO RIESGO I INTERMEDIO - 2 O ALTO RIESGO, NO CANDIDATO A TRASPLANTE O QUIMIOTERAPIA A ALTAS DOSIS	NO APROBADO	2017	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79446	NO APROBADO	Oct-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_072_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Leucemia mieloide aguda debut no elegibles para quimioterapia intensa	AZACITIDINA 100 mg	Inyectable	Terapia de soporte	EN LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON BLASTOS DEL 20-30%, DISPLASIA MULTILINEAL O MAYORES DE 75 AÑOS O QUE TIENEN CONMORVILIDADES QUE IMPIDEN EL USO DE QUIMIOTERAPIA INTENSA DE INDUCCIÓN	NO APROBADO			APROBADO	Nov-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_083_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes con síndrome mielodisplásico con IPSS intermedio-2 o de alto riesgo y IPSS-R intermedio, alto o muy alto no candidatos a trasplante o quimioterapia de alta intensidad.	AZACITIDINA 100 mg	Inyectable	Tratamiento de soporte	Análisis de costo efectividad para Azacitidina 100 mg inyección, para el tratamiendo de pacientes con síndromes melodiplásico de bajo riesgo o intermedio - 2 o alto riesgo no candidato a trasplante o quimioterapia a altas dosis	NO APROBADO	2017	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79447	NO EVALUADO	Abr-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/Dictamen_028_azacitidina_sd.mielodisplasico.pdf			
Pacientes con Leucemia mieloide aguda debut no tributario a quimioterapia intensa	AZACITIDINA 100 mg	Inyectable	Terapia de soporte	Análisis de costo efectividad para azacitidina 100 mg inyección para el tratamiendo de pacientes con leucemia mieloide aguda con blastos del 20-30%, displasia multilínea o mayores de 75 años o que tienen conmorbilidades que impiden el uso de quimioterapia intensa de inducción	NO APROBADO			NO EVALUADO	Nov-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_083_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes adultos con linfoma no Hodgkin indolente (folicular) refractario o resistente a rituximab	BENDAMUSTINA 100 mg	Polvo para solución EV	Placebo	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON LINFOMA FOLICULAR QUE NO HAN RESPONDIDO O HAN PROGRESADO DURANTE O HASTA 6 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON RITUXIMAB	NO APROBADO			NO APROBADO	Oct-18	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_040_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2018_compressed.pdf			
Los pacientes incluidos en este reporte son mujeres con cáncer de ovario epitelial avanzado o recurrente, pudiendo haber sido resistentes o sensibles a terapias con platino.	BEVACIZUMAB 25 mg / mL	Inyectable	quimioterapia tradicional sola o más placebo.	EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO Y PACLITAXEL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CARCINOMA EPITELIAL DE OVARIO, RECURRENTE, SENSIBLE A PLATINO	NO APROBADO			NO APROBADO	Ene-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1009263/bevacizumab_quimioterapia_tratamiento_1a_linea_cancer_ovario_epitelial.pdf			
Cancer colorrectal metastásico	BEVACIZUMAB 25 mg / mL	Inyectable	Quimioterapia en base a fluoropirimidinas	Análisis de costo efectividad para bevacizumab 25 mg/ml (4 y 16 mL) inyectable, en combinación con quimioterapia (cisplatino/carboplatino y paclitaxel) seguido como agente único de mantenimiento, para el tratamiento se primera línea en pacientes con cancer coloretal avanzadi	NO APROBADO			NO APROBADO	Ene-19	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/DICT_038_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico	BEVACIZUMAB 400 mg / 100 mg	Inyectable	Quimioterapia o Cetuximab + quimioterapia	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTE ADULTO CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLÓN O RECTO, METASTÁSICO EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN FLUROPRIMIDINAS	NO APROBADO	Jun-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/10/1122087/ets-005-2020-bevacizumab-para-ca-colorectal-metastasico.pdf	NO APROBADO	Jun-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_038_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Paciente con leucemia primaria de células plasmáticas y elegible para trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)	BORTEZOMIB 3.5 mg	Inyectable	Ciclofosfamida + lenalidomida +dexametasona	EN COMBINACIÓN CON LENALIDOMIDA Y DEXAMETASONA, PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON LEUCEMIA PRIMARIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	NO APROBADO	2017	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79449	APROBADO	Feb-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT015_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2016.pdf			
Linfoma periférico de células T, subtipo anaplásico de células grandes sistémico, CD30 positivo, ALK negativo, en pacientes sin tratamiento previo	BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 mg	Polvo para perfusión endovenosa	CHOP	TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN EN PACIENTES ADULTOS CON LINFOM DE HODKING C030+ POST TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS CON RIESGO DE RECAÍDA	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-17	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_060_SDEPFYOTS_DETS_2017.pdf			
Paciente adulto con cáncer de cabeza y cuello* recurrente metastásico e irresecable sin tratamiento sistémico previo en enfermedad metastásica	CETUXIMAB 100 mg / 20 mL	Solución Inyectable endovenosa	Quimioterapia basada en platino y fluorouracilo	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO, NO NASOFARINGEO METASTÁSICO O EN PRIMERA RECURRENCIA	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/387	NO EVALUADO	Mar-18	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_006_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2018.pdf			
Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico de localización izquierda y genes RAS no mutados	CETUXIMAB 5 mg	Inyectable	FOLFOX	PARA PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO QUE HAYAN FRACASADO AL TRATAMIENTO CON OXALIPLATINO E IRINOTECAN Y/O NO TOLEREN IRINOTECAN	NO APROBADO	2013	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79420	NO APROBADO	Mar-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2016/04/Dictamen_024_cetuximab_ca_colorectal_metastasico.pdf			
Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico de localización izquierda y genes RAS no mutados	CETUXIMAB 5 mg	Inyectable	• Quimioterapia • Panitumumab + quimioterapia	Análisis de costo efectividad para cetuximab 5 mg / ml inyrectable, para el trataminto de primera línea decáncer de colon o recto metastásico en combinación con quimioterapia basada en fluoropirimidas	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/329	NO EVALUADO					
Pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico de localización izquierda y genes RAS no mutados	CETUXIMAB 5 mg	Inyectable	Quimioterapia o Panitumumab + quimioterapia	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTE ADULTO CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLÓN O RECTO, METASTÁSICO EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN FLUROPRIMIDINAS	NO APROBADO	Ene-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/01/1354015/ets_01_2021_cetuximab_ca_colorectal.pdf	NO APROBADO	Oct-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_075_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes adultos con leucemia de células vellos	CLADRIBINA 10 mg	Inyectable	Placebo o mejor terapia	PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA DE CÉLULAS VELLOSAS	NO APROBADO			APROBADO	Feb-17	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_13_SDEPFYOTS_DETS_2017.pdf			

Pacientes adultos con mieloma múltiple refractarios o en recaída luego de al menos una línea de tratamiento	DARATUMUMAB 100 mg / 5 ml	Inyectable	Lenalidomida y dexametasona | Bortezomib y dexametasona	EN COMBINACIÓN CON LENALIDOMIDA Y DEXAMETASONA, O BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA, PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE QUE HAN RECIBIDO AL MENOS UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO PREVIO	NO APROBADO			NO APROBADO	setie-2019	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/DICT_036_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019.pdf https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_003_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019_compressed.pdf			
Pacientes con TOCG metastásico	DENOSUMAB 120 mg / 1.7 mL	Solución Inyectable subcutánea	Bifosfonatos Ninguna intervención Placebo	TRATAMIENTO DE PACIENTS ADULTOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO HISOPATOLÓGICO DE TUMOR ÓSEO DE CÉLULAS GIGANTES (TOCG) IRRESECABLE	NO APROBADO			APROBADO	Ago-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_063_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Paciente mujer con cáncer de ovario avanzado	DOXORRUBICINA LIPOSOMAL 2 mg / mL	Inyectable		PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE OVARIO AVANZADO EN MUJERES EN LAS QUE HA FALLADO UNRÉGIMEN DE QUIMIOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA CONTENIENDO PLATINO	NO APROBADO	2013	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79422	NO EVALUADO					
Pacientes con cáncer de mama metastásico que progresaron a 2 o más líneas de tratamiento	DOXORRUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA 2 mg / mL	Inyectable	Doxorrubicina convencional	Análisis de costo efectividad para Doxorrubicina Liposomal Pegilada (2mg/mL) en pacientes adultos con cáncer de mama metastásico con riesgo cardiaco	APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/315	NO EVALUADO		https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/11/1400389/revision-rapida-n-003-2022.pdf			
PACIENTES VARONES ADULTOS CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO	ENZALUTAMIDA 4 mg	Cápsula	Terapia de privación de andrógenos (ADT)	TRATAMIENTO PACIENTES VARONES ADULTOS CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN NO METASTÁSICO	NO APROBADO			NO APROBADO	dicembre-2021	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357718/dict-35dets2021documento-ad-hoc-apalutamida-enzalutamida.pdf			
Pacientes adultos con diagnóstico de cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración y tiempo de duplicación del PSA 5 10 meses	ENZALUTAMIDA 40 mg	Cápsula	ADT	Tratamiento de Pacientes con cáncer de próstata metastásico visceral resistente a la castración con progresión a quimioterapia previa.	NO APROBADO			APROBADO	Dic-19	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/DICT_056_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019-1.pdf			
Pacientes adultos con diagnóstico de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico	ENZALUTAMIDA 40 mg	Cápsula	ADT	TRATAMIENTO DE PACIENTES VARONES ADULTOS CON CÁNCER DE PRÓSTATA NO METASTÁSICO RESISTENTE	NO APROBADO			APROBADO	Dic-21	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_035_DETS_2021.pdf			
Cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que ha progresado a inhibidores de aromatasa no esteroideos y a más de una línea de quimioterapia	EVEROLIMUS + EXEMESTANO 10 mg + 25 mg	Tableta	Exemestano	TRATAMIENTO DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO, HR POSITIVO, HER 2 NEGATIVO, SIN CRISIS VISCERAL, RESISTENTE AL TRATAMIENTO ENDOCRINO DE PRIMERA LÍNEA	NO APROBADO	2017	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79452	NO APROBADO	Dic-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_067_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA LUMINAL METASTÁSICO O RECURRENTE	EXEMESTANO 25 mg	Tableta	Quimioterapia	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA LUMINAL METASTÁSICO O RECURRENTE, INTOLERANTE A ANASTRAZOL	APROBADO	2021	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/332	NO EVALUADO					
Pacientes adultas con cáncer de mama HR+/HER2- metastásico	FULVESTRANT 250 mg/ 5 mL	Inyectable	Inhibidor de aromatasa	TRATAMIENTO DE MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO RECEPTOR HORMONAL POSITIVO NO TRATADAS CON TRATAMIENTO HORMONAL	NO APROBADO	Jun-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/10/1122700/ets-007-2020-fulvestrant-para-ca-mama-metastasico.pdf	NO APROBADO	Dic-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357933/dict-31dets2021fulvestrant.pdf			
Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama que expresa receptores hormonales (estrógeno, progesterona o ambos) con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, progresando durante el tratamiento con terapia endocrina, en estado funcional 0-2 de la ECOG. Excluyeron pacientes con crisis visceral.	FULVESTRANT 250 mg/ 5 mL	Inyectable	Inhibidores de aromatasa. Tres estudios usaron anastrozol 1 mg VO (35),(36), (38); Dos estudios usaron exemestano 25 mg VO (34), (37).	TRATAMIENTO DE MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO Y CON RECEPTOR HORMONAL POSITIVO, CUYA ENFERMEDAD PRESENTA RECURRENCIA DURANTE O DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ADYUVANTE CON ANTIESTRÓGENOS	NO APROBADO			NO APROBADO	Jul-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_050_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Paciente adulto* con diagnóstico de leucemia linfática crónica/ linfoma linfocítico de células pequeñas, recaído/refractario a inmunoquimioterapia	IBRUTINIB 140 mg	Cápsula	No hay alternativa en el petitorio de EsSalud (Mejor Terapia de Soporte)	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA O LINFOMA LINFOCÍTICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS, RECAÍDO O REFRACTARIO A INMUNOHISTOQUIMIOTERAPIA	NO APROBADO			APROBADO	Dic-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/01/966454/058-ibrutinib_llc.pdf			
Pacientes adultos con cáncer de mama triple negativo localmente avanzado o metastásico que han recibido terapia previa con alguna antraciclina, algún taxano y capecitabina	IXABEPILONA 15 mg / 45 mg	Inyectable	Quimioterapia como monoterapia o terapia combinada con gemcitabina, vinorelbina o agentes que contienen platino	COMO MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO METASTÁSICO QUE HAN RECIBIDO TERAPIA PREVIA INCLUYENDO UNA ANTRACICLINA, UN TAXANO Y CAPECITABINA	NO APROBADO	Mar-23	Ixabepilona_informe_ETS-EMC_final.pdf (www.gob.pe)	NO APROBADO	Oct-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357955/dict-27dets2021ixabepilona.pdf	No aprobado	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432319/Ixabepilona_informe_ETS-EMC_final.pdf?v=1681487693
Pacientes con cáncer de mama triple negativo resistente a antraciclinas y taxanos	IXABEPILONA 15 mg / 45 mg	Inyectable	Quimioterapia como monoterapia o terapia combinada con gemcitabina, vinorelbina o agentes que contienen platino	COMO MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O LOCALMENTE AVANZADO DESPUÉS DE FRACASAR A UNA ANTRACICLINA, UNTAXANO Y CAPECITABINA	NO APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432319/Ixabepilona_informe_ETS-EMC_final.pdf	NO APROBADO	Oct-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357955/dict-27dets2021ixabepilona.pdf			
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama avanzado con expresión HER2 que progresaron a 1 línea de tratamiento con trastuzumab/quimioterapia	LAPATINIB 250 mg/ 5 mL	Tableta	Quimioterapia	EN COMBINACIÓN CON CAPECITABINA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 SOBRE EXPRESADO METASTÁSICO QUE HAN RECIBIDO TERAPIA PREVIA INCLUYENDO UNA ANTRACICLINA, UN TAXANO Y TRASTUZUMAB	NO APROBADO			NO EVALUADO					
Pacientes adultos con mieloma múltiple sometidos a trasplante autólogo de células madre	LENALIDOMIDA 10 mg	Cápsula	Placebo u observación	TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE POST TRASPLANTES AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	NO APROBADO	Jun-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/10/1122091/ets-008-2020-lenalidomida-para-mieloma-multiple.pdf	NO APROBADO	May-19	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_018_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019.pdf			

Pacientes con cáncer de tiroides diferenciado yodo refractario	LENVATINIB 10 mg / 4 mg	Cápsula	Sorafenib	TRATAMIENTO DE CARCINOMA DE TIROIDES DIFERENCIADO PROGRESICO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, REFRACTARIO A YODO RADIOACTIVO	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/397	NO APROBADO	Ene-20	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_006_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2020.pdf			
Paciente adulto con adenocarcinoma de páncreas metastásico, sin tratamiento sistémico previo	NAB-PACLITAXEL 5 mg / mL	Inyectable	Gemcitabina	EN ASOCIACIÓN CON GEMTANCINA PARA EL TRATAMIENDO DE PRIMERA LÍNEA DE PACIENTES CON CÁNCER DE PÁNCREAS METASTÁSICO	NO APROBADO			NO APROBADO	Nov-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_084_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
pacientes con leucemia mieloide crónica, sin mutación T315I, con resistencia o intolerancia a imatinib o dasatinib	NILOTINIB 200 mg	Cápsula	Dasatinib u otro TKI	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA CON RESISTENCIA O INTOLERANCIA A IMATINIB Y A DASATINIB SIN MUTACIÓN T315I	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/376	APROBADO	Nov-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_070_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) tipo no escamoso, metastásico, y progresivo a primera línea	NIVOLUMAB 10 mg / mL	Inyectable	Docetaxel 75 mg/m2 ev cada 3 semanas.	COMO SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS METASTÁSICO, CON PDL2 ≥ 1%, QUE PROGRESARON A UNA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA SOLA	NO APROBADO			NO APROBADO	set-2017	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_045_SDEPFYOTS_DETS_2017.pdf			
Paciente adulto con cáncer renal de células claras metastásico que ha progresado a primera línea de tratamiento con inhibidor de la tirosina quinasa	NIVOLUMAB 100 mg / 10 ml / 4 mg / 40 ml	Inyectable	Mejor terapia de soporte	CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES AVANZADO O METASTÁSICO ECOG 0-2 QUE HAN RECIBIDO TERAPIA ANTIANGIOGÉNICA PREVIA	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/399	NO APROBADO	May-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1362271/017-nivolumab.pdf			
Pacientes adultos con diagnóstico de carcinoma renal de células claras avanzado∞, irresecable, con progresión de enfermedad a dos líneas de terapia anti-angiogénica	NIVOLUMAB 100 mg / 10 ml / 40 mg / 40 ml	Inyectable	Mejor terapia de soporte paliativo	Análisis de costo efectividad para nivolumab (10 mg / mL) solución inyectable intravenosa para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de carcinoma de células renales avanzado que ha recibido terapia antiangiogénica previa	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/399	NO APROBADO	Oct-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1361814/dict-n-45-2019-nivolumab_ccr-progresivo.pdf			
Pacientes con diagnóstico de melanoma cutáneo estadio IIIAB-C-D y IV operados	NIVOLUMAB 100 mg / mL	Inyectable	Pembrolizumab	COMO TRATAMIENDO ADYUVANTE DE MELANOMA CUTÁNEO ESTADIO III, CON AFECTACIÓN GANGLIONAR, COMPLETAMETE RESECADO	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/368	NO EVALUADO					
Pacientes con diagnóstico de melanoma cutáneo irresecable o metastásico en primera línea de tratamiento	NIVOLUMAB 100 mg / mL	Inyectable	quimioterapia	TRATAMIENTO DE MELANOMA CUTÁNEO IRRESECABLE METASTÁSICO, SIN TRATAMIENTO PREVIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MUTACIÓN	NO APROBADO	Jun-22	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/10/1122695/ets-009-2020-nivolumab-para-melanoma.pdf	APROBADO	set-2016	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_065_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes adultos con melanoma irresecable o metastásico	NIVOLUMAB 100 mg / mL	Inyectable	Quimioterapia o Nivolumab + ipilimumab	Análisis de costo efectividad para Nivoluman 100 mg/ 10 mL, para el tratamiento de pacientes con melanoma cutáneo irresecable metastásico, sin tratamiento previo, independientemente de mutación	NO APROBADO	Jul-05	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/322	NO EVALUADO	set-2016	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_065_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes adultos con diagnóstico de linfoma no Hodgkin indolente (folicular) refractario o resistente a rituximab* (* Pacientes que no responden o progresan durante o hasta 6 meses después del tratamiento)	OBINUTUZUMAB 1000 mg / mL	Concentrado para solución EV	Placebo	TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON LINFOMA FOLICULAR QUE NO HAN RESPONDIDO O HAN PROGRESADO DURANTE O HASTA 6 MESES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CO RITUXIMAB	NO APROBADO			NO APROBADO	Oct-18	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/09/1016112/obinutuzumab_mas_bendamustina_pacientes_-adultos_linfoma_no_ho_walmcZt.pdf			
pacientes con TNE avanzados (inoperables o metastásicos), originados en intestino medio (excluyeron páncreas, tórax y otros orígenes), bien diferenciados, con enfermedad medible, Karnofsky 60% o más sin opción de tratamiento curativo.	OCTREÓTIDA ACETATO LAR 30 mg	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	: Placebo intramuscular cada 28 días	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TUMORES NEUROENDOCRINOS AVANZADOS PRIMARIO DE ORIGEN GASTROINTESTINAL O TUMOR NEUROENDOCRINO PRIMARIO DE ORIGEN DESCONOCIDO	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/391	NO APROBADO	Jul-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1361878/dict-n-028-2019-octreotida_cancergastrointestinal.pdf			
Pacientes con cáncer de ovario epitelial de alto grado avanzado (estadio FIGO III y IV) trompa de Falopio, o peritoneal primario con mutación deletérea en los enes BRCA1/2 (germinal o somática), con respuesta parcial o completa a una primera línea de tratamiento quimioterápico a base de platino (carboplatino, cisplatino). Pacientes con cáncer de ovario epitelial de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal primario, recaídas, sensible a platino, que están en respuesta (completa o parcial) a quimioterapia basada en platino.	OLAPARIB 150 mg	Tableta	Placebo; Niraparib	MANTENIMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER EPITELIAL RECURRENTE DE OVARIO DE ALTO GRADO CON RESPUESTA COMPLETA O PARCIAL A QUIMIOTERAPIA BASADA EN PLATINO CON MUTACIÓN BRCA 1/2	NO APROBADO			NO APROBADO	Feb-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1009372/olaparib-cancer_ovario_epitelial_alto_grado_platino_sensible_c_gP4fJn7.pdf			
Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado o metastásico, irresecable, con mutación del EGFR, y progresión de enfermedad a inhibidores de tirosina quinasa de EGFR de primera línea, positivos para la mutación T790M	OSIMERTINIB 80 mg	Comprimidos Recubiertos	Quimioterapia basada en platino	CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, METASTÁSICO EN PROGRESIÓN A UN INHIBIDOR DE TIROSINA QUINASA ANTI EGFR QUE EXPRESA LA MUTACIÓN T790M	NO APROBADO			NO APROBADO	Jul-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1361876/dict-n-029-2019-osimertinib_cancerpulmoncno.pdf			

Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico	OSIMERTINIB 80 mg	Comprimido recubierto	Erlotinib	COMO MONOTERAPIA DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES ADULTOS CON CARCINOMA BRONCOPULMONAR NO MICROCÍTICO (CPNM) LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO CON MUTACIONES EN LA DELECIÓN DEL EXÓN 19 O LA MUTACIÓN L858R DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGFR)	NO APROBADO			NO APROBADO	Ene-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1359490/dict-n-07sdepfyots2020osimertinib_cpcnp.pdf			
Pacientes con diagnóstico de CPCNP metastásico con mutación positiva del EGFR - T790M, tras una progresión a un ITK	OSIMERTINIB 80 mg	Comprimidos Recubiertos	Quimioterapia	Osimertinib para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico en progresión a un inhibidor de tirosina quinasa anti EGFER que expresa la mutación T790M	NO APROBADO			NO EVALUADO	Jul-19	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1361876/dict-n-029-2019-osimertinib_cancerpulmoncno.pdf			
Mujeres postmenopáusicas o pre/perimenopáusicas con cáncer de mama metastásico o avanzado con positividad de RH y HER2 negativo sin terapia endócrina inicial o con progresión a terapia hormonal.	PALBOCICLIB 75 mg / 100 mg / 125 mg	Tableta	Placebo + inhibidor de aromatasa (letrozol) Placebo + goserelin + tamoxifeno o inhibidor de aromatasa (anastrozol/letrozol) Placebo + fulvestrant	EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT PARA EL TRATAMIENDO DE MUJERES POST MENOPÁUSICAS CON ´CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO CON RH (+) Y HER2 (-), COMO TERAPIA ENDOCRINA INICIAL O DESPUÉS DE LA PROGRESIÓN CON TERAPIA PREVIA	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-18	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_047_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2018.pdf			
Mujeres postmenopáusicas o pre/perimenopáusicas con cáncer de mama metastásico o avanzado con positividad de RH y HER2 negativo sin terapia endócrina inicial o con progresión a terapia hormonal.	PALBOCICLIB 75 mg / 100 mg / 125 mg	Tableta	Placebo + inhibidor de aromatasa (letrozol) Placebo + goserelin + tamoxifeno o inhibidor de aromatasa (anastrozol/letrozol) Placebo + fulvestrant	EN COMBINACIÓN CON FULVESTRANT PARA EL TRATAMIENDO DE MUJERES POST MENOPÁUSICAS CON ´CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO CON RH (+) Y HER2 (-), COMO TERAPIA ENCDOCIRNA INICIAL O DESPUÉS DE LA PROGRESIÓN CON TERAPIA PREVIA	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-18	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_047_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2018.pdf			
Pacientes con cáncer colorrectal metastásico no tratados previamente, en ECOG 0-2, con al menos una lesión medible, sin uso previo de oxaliplatino como tratamiento adyuvante. Se permitía haber recibido 5- Fluorouracilo en el tratamiento con intención curativa pero al menos 6 meses antes de entrar al estudio	PANITUMUMAB 20 mg / mL	Inyectable	FOLFOX-4 solo	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTE ADULTO CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLÓN O RECTO, METASTÁSICO EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA BASADA EN FLUROPRIMIDINAS	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-20	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_14_DETS_2020.pdf			
Pacientes con melanoma maligno con enfermedad metastásica o irresecable, sin tratamiento previo[7]	PEMBROLIZUMAB 10 mg / mL	Inyectable	Dacarbazina	TRATAMIENTO DE MELANOMA CUTÁNEO IRRESECABLE METASTÁSICO, SIN TRATAMIENTO PREVIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MUTACIÓN	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/373	NO APROBADO	Ago-16	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_061_SDEPFYOTS_DETS2016_compressed.pdf			
Paciente adulto con adenocarcinoma de pulmón metastásico EGFR negativo, ALK negativo, PDL1 ≥ 50 %, sin tratamiento previo, ECOG 0-1.	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 ml	Inyectable	Quimioterapia basada en platino.	MONOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMER LÍNEA EN PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS METASTÁSICO SIN EXPRESIÓN DE ANOMALÍAS TUMORALES DE GENÓMICAS TIPO EGFR O ALK Y CUYOS TUMORES EXPRESEN PD-L1 ≥ 50%	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/350	NO APROBADO	Dic-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1359375/dict-n-16dets2020pembrolizumab.pdf			
Pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas metastásico	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 ml	Inyectable	1° Línea: - Quimioterapia basada en platino 2° Línea: - Docetaxel - Inhibidores tirosina quinasa (EGFR: erlotinib, gefitinib, osimertinib; ALK: crizotinib, alectinib, ceritinib; ROS: crizotinib) - Inhibidores de puntos de control inmunitarios - Docetaxel + Ramucirumab o Nintedanib	COMO SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS METASTÁSICO, CON PDL2 ≥ 1%, QUE PROGRESARON A UNA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA SOLA	NO APROBADO			NO APROBADO	May-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/06/DICT.-025-DETS-2022.pdf			
Pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas metastásico	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 ml	Concentrado para solución para perfusión	1° Línea: - Quimioterapia basada en platino 2° Línea: - Docetaxel - Inhibidores tirosina quinasa (EGFR: erlotinib, gefitinib, osimertinib; ALK: crizotinib, alectinib, ceritinib; ROS: crizotinib) - Inhibidores de puntos de control inmunitarios - Docetaxel + Ramucirumab o Nintedanib	EN COMBINACIÓN CON PCLITAXEL Y PLATINO PARA EL TRATAMINTO DE 2ERA LÍNEA DEL CÁCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS METASTÁSICO Y DE TIPO ESCAMOSO EN ADULTOS SIN TRATAMIENTO PREVIO, SIN EXPRESIÓN DE ANOMALÍAS TUMORALES GENÓMICAS TIPO EGFR O ALK, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXPRESIÓN EL MARCADOR PD-L	NO APROBADO			NO EVALUADO	Dic-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1359375/dict-n-16dets2020pembrolizumab.pdf			
Pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas metastásico	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 mL	Concentrado para solución para perfusión	1° Línea: - Quimioterapia basada en platino 2° Línea: - Docetaxel - Inhibidores tirosina quinasa (EGFR: erlotinib, gefitinib, osimertinib; ALK: crizotinib, alectinib, ceritinib; ROS: crizotinib) - Inhibidores de puntos de control inmunitarios - Docetaxel + Ramucirumab o Nintedanib	EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, METASTÁSICO Y DE TIPO NO ESCAMOSO EN ADULTOS SIN TRATAMIENTO PREVIO, SIN EXPRESIÓN DE ANOMALÍAS TUMORALES GENÓMICAS TIPO EGFR O ALK, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXPRESIÓN EL MARCADOR PD-L1	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-20	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1359375/dict-n-16dets2020pembrolizumab.pdf			

CPNCP etapa IV confirmado por histología o citología, sin mutaciones de EGFR ni translocación de ALK, sin tratamiento previo para enfermedad metastásica, en ECOG 0-1, al menos una lesión medible por RECIST, y un score de expresión de PDL1 de al menos 50% en la biopsia.	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 mL	Concentración para solución para perfusión	Quimioterapia a elección del investigador (carboplatino + pemetrexato, cisplatino + pemetrexato, cisplatino + pemetrexato, carboplatino + gemcitabina o carboplatino + paclitaxel), hasta un máximo de 4-6 ciclos	Anáslisis de costo efectividad para Pembrolizumab (100 mg / 4 mL) concentrado para solución para perfusión, en combinación con quimioterapia para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico y de tipo escamoso en adultos sin tratamiento previo, sin expresión de anomalías tumorales genómicas tipo EGFR o ALK, independientemente de la expresión del marcador PD-L1	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/01/966203/059-pembrolizumab.pdf			
Pacientes con diagnóstico de melanoma cutáneo estadio IIIAB-C-D y IV operados	Nivolumab 240mg	Inyectable	Pembrolizumab	COMO TRATAMIENDO ADYUVANTE DE MELANOMA CUTÁNEO ESTADIO III, CON AFECTACIÓN GANGLIONAR, COMPLETAMETE RESECADO	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/368	NO EVALUADO					
Pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico en primera línea de tratamiento	PERTUZUMAB 420 mg / 14 mL	Inyectable	Quimioterapia	EN COMBINACION CON TRASTUZUMAB Y/O QUIMIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO ADYUVANTE DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO	APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4311161/Informe%20ETS-EMC%20Pertuzumab_final.pdf.pdf	NO APROBADO	Dic-21	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_042_DETS_2021.pdf			
Paciente adulto con cáncer de mama HER 2* positivo metastásico, sin terapia sistémica previa en enfermedad metastásica. ECOG 0-2	PERTUZUMAB 420 mg / 14 mL	Inyectable	Trastuzumab + docetaxel	EN COMBINACIÓN CON TRASTUZUMAB Y DOCETAXEL PARA EL TRATAMIENDO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO METASTÁSICO QUE NO HAN RECIBIDO PREVIAMENTE TERAPIA ANTI HER2 O QUIMIOTERAPIA PARA LA ENFERMEDAD METASTÁSICA	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/342	APROBADO	Feb-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1362449/081-pertuzumab.pdf	APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4311161/Informe%20ETS-EMC%20Pertuzumab_final.pdf.pdf?v=1679587858
Pacientes adultos con linfoma o mieloma múltiple candidatos a trasplante autólogo con difícil movilización de células progenitoras hematopoyéticas	PLERIXAFLOR 20 mg / mL	Solución inyectable	Filgrastim 10ug/kg/día (G-CSF)	EN COMBINACIÓN CON FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE GRANULOCITOS (G-CSF) EN PACIENTES CON LINFOMA O MIELOMA MÚLTIPLE O TUMORES SÓLIDOS SENSIBLES A QUMIOTERAPIA CANDIDATA A TRASPLANTE AUTÓLOGO CON DIFÍCIL MOVILIZACIÓN DE CÉLULAR PROGRENITORAS HEMATOPOYÉTICAS	NO APROBADO			NO APROBADO	May-19	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_017_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019.pdf			
Paciente adulto con diagnóstico de hepatocarcinoma avanzado con progresión de enfermedad a sorafenib	REGORAFENIB 40 mg	Tableta	Mejor terapia de soporte paliativo	TRATAMIENDO DE PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA CELULAR AVANZADO CON PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD A SORAFENIB	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/377	APROBADO	Oct-19	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_044_SDEPFYOTS_DETS_IETSI_2019.pdf			
Pacientes con cáncer gastrointestinal metastásico con progresión de enfermedad luego de imatinib y sunitinib	REGORAFENIB 40 mg	Tableta	Mejor terapia de soporte	Tratamiento de GIST metastásico con progresión de enfermedad luego de imatinib y sunitinib	NO APROBADO			NO APROBADO	Oct-17	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_052_SDEPFYOTS_DETS_2017.pdf			
Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico rh + her2- sin tratamiento previo. Ecog hasta 1. Enf medible o lesión osoes lítica por lo menos.	RIBOCICLIB 200 mg	Tableta	placebo+letrozol 2.5 mg dia (n=334).	EN COMBINACIÓN CON UN INHIBIDOR DE AROMATASA, PARA EL TRATAMIENTO DE MUJEREDS PERI Y PRE MENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO O METASTÁSICO CON POSITIVDAD A RECEPTORES HORMONALES (RH+) Y NEGATIVIDAD AL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO HUMANO (HER2-), COMO TERAPIA ENDOCRINA INICIAL	NO APROBADO	2021	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/336	NO APROBADO					
Pacientes con diagnóstico de Hepatocarcinoma no operable o metastásico, sin tratamiento sistémico previo, con CHILD-PUGH Clase A.	SORAFENIB 200 mg	Tableta	Placebo	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA CELULAR CON ENFERMEDAD INOPERABLE O METASTÁSICA SIN TRATAMIENTO SISTÉMICO PREVIO	NO APROBADO	2017	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/79459	APROBADO	Ene-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/dictamen_003_DETS_ITESI_2016.pdf			
Pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides yodo refractario.	SORAFENIB 200 mg	Tableta	Placebo	TRATAMIENTO DE CARNCINOMA DE TIROIDES DIFERNCIADO PROGRESIVO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, REFRACTARIOA YODO RADIOACTIVO	NO APROBADO			NO APROBADO	Ago-16	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_056_SDEPFYOTS_DETS.pdf			
Pacientes con cáncer de ovario platino resistente	TOPOTECAN 4.0 mg	Polvo para solución inyectable	Otros tratamientos (doxo liposomal y paclitaxel)	TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER EPITELIAR DEL OVARIO QUE HAN PROGRASADO A UNA PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO BASADA EN PLATINO, EN LOS CUALESEL PLATINO NO ES UNA OPCIÓN	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/361	NO EVALUADO					
Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER2+.	TRASTUZUMAB 420 mg	Inyectable	Quimioterapia	COMO NEOADYUVANCIA PARA PACIENTES CON CANCER DE MAMA HER2 POSITIVO	APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3094396/ETS-010-2020%20Trastuzumab%20para%20Ca%20%20mama%20metastasico.pdf?v=1652387274	APROBADO	Feb-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1362449/081-pertuzumab.pdf			
Pacientes adultas con cáncer de mama HER2+ metastásico	TRASTUZUMAB 420 mg	Inyectable	Quimioterapia	COMO TRATAMIENDO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO, CUYOS TUMORES SOBRE EXPRESAN HER2 O TIENEN AMPLIFICACIÓN DEL GEN HER2	APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/347	APROBADO	Feb-17	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/03/1362449/081-pertuzumab.pdf			
Pacientes adultos con cáncer gástrico* metastásico, cuyos tumores tienen sobreexpresión de HER2**, que no han recibido tratamiento previo para enfermedad metastás	TRASTUZUMAB 420 mg	Polvo para perfusión intravenosa	Quimioterapia basado en un platino (cisplatino u oxaliplatino) y una fluoropirimidina (fluorouracilo)	EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA, PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTS CON ADENOCARCINOMA GÁSTRICO O DE UNIÓN GASTROESOFÁGICA METASTÁSICO, HER2-POSITIVO, QUE NO HaYAN RECIBIDO UN TRATAMIENTO PREVIO PARA METÁSTASIS	APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/379	NO APROBADO	May-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358391/dict-14dets2021trastuzumab.pdf			
Pacientes adultos con cáncer gástrico* metastásico, cuyos tumores tienen sobreexpresión de HER2**, que no han recibido tratamiento previo para enfermedad metastásica.	TRASTUZUMAB 420 mg	Polvo para perfusión intravenosa	Quimioterapia basado en un platino (cisplatino u oxaliplatino) y una fluoropirimidina (fluorouracilo)	Análisis de costo efectividad para Trastuzumab (420 mg - 440 mg)	APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/324	NO APROBADO	May-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358391/dict-14dets2021trastuzumab.pdf			

Cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado con enfermedad invasiva residual después de tratamiento neoadyuvante con trastuzumab y quimioterapia	TRASTUZUMAB EMTANSINA 100 mg / 160 mg	Inyectable	Adyuvante con trastuzumab	TRATAMIENTO ADYUVANTE DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TEMPRANO HER2 POSITIVO, QUIENES TIENEN ENFERMEDAD INVASIVA RESIDUAL LUEGO DE TRATAMIENTO NEOADYUVANTE BASADO EN TAXANOS Y TRASTUZUMAB	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/343	NO APROBADO	Feb-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/02/DICT.-006-DETS-2022.pdf			
Pacientes con diagnóstico de melanoma maligno irresecable o metastásico BRAF mutado (V600E-V600K) sin tratamiento sistémico previo	VEMURAFENIB + COBIMETINIB 240 mg + 20 mg	Tableta	Quimioterapia (Dacarbazina 1000 mg/m2 cada 3 semanas) intravenoso hasta progresión o toxicidad inaceptable	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MELANOMA MALIGNO IRRESECABLE O METASTÁSICO CON BRAF V600 MUTADO	NO APROBADO	2022	http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/370	NO APROBADO	Ago-22	http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/directivas/DICT_03_DETS_2020.pdf			
Pacientes con diagnóstico de melanoma maligno irresecable o metastásico BRAF mutado (V600E-V600K) sin tratamiento sistémico previo	VEMURAFENIB 240 mg	Tableta	Quimioterapia (Dacarbazina 1000 mg/m2 cada 3 semanas) intravenoso hasta progresión o toxicidad inaceptable	TRATAMIENTO DE PACIENTES CON MELANOMA MALIGNO IRRESECABLE O METASTÁSICO CON BRAF V600 MUTADO	NO APROBADO			NO APROBADO	Feb-17	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_12_SDEPFYOTS_DETS_2017_compressed.pdf			
Pacientes adultos con melanoma maligno, mestastásico, irresecable, mutación BRAF V600 que han progresado a primera línea con nivolumab	VEMURAFENIB 240 mg	Tableta	Quimioterapia	Pacientes adultos con melanoma maligno avanzado o metastásico, con mutación BRAF V600E, inoperable y con ECOG 0-1	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357647/dict-41dets2021vemurafenibcobimetinib.pdf			
Cáncer colorrectal metastásico con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas	REGORAFENIB 40 mg	Tableta	Mejor terapia de soporte	Tratamiento de Cáncer colorrectal metastásico con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas	NO APROBADO			NO APROBADO	Ago-17	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT_037_SDEPFYOTS_DETS_2017_compressed.pdf			
Paciente con cáncer de cérvix metastásico, recurrente o persistente, sin tratamiento sistémico previo	Bevacizumab 15mg/kg	Inyectable	Quimioterapia con cisplatino más paclitaxel	mujeres con cáncer de cérvix metastásico, recurrente o persistente, sin tratamiento sistémico previo, no susceptible de tratamiento curativo con cirugía y/o radioterapia	NO APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432237/Bevacizumab_ETS%20EMC%20_Ca_Cervical_%20final.pdf?v=1681486978	NO APROBADO	Jun-18	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1010172/bevacizumab_combinacion_quimioterapia_tratamiento_cancer_cuell_Gc5laE7.pdf	No aprobado	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432237/Bevacizumab_ETS%20EMC%20_Ca_Cervical_%20final.pdf?v=1681486978
Pacientes con melanoma maligno irresecable o metastásico sin tratamiento sistémico previo	Nivolumab 240mg	Inyectable	Quimioterapia monoterapia o combinada	Tratamiento para pacientes con MM (incluye melanoma cutáneo y melanoma mucoso) irresecable o metastásico sin tratamiento sistémico previo.	APROBADO	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432288/Nivoumab_informe_ETS-EMC_final.pdf?v=1681487422	APROBADO	Oct-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/DICT.-039-DETS-2022.pdf	Aprobado	Mar-23	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4432288/Nivoumab_informe_ETS-EMC_final.pdf?v=1681487422
Pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas	DARATUMUMAB 100 mg / 5 ml	Inyectable	Bortezomib, melfalán y prednisona	Tratamiento de mieloma múltiple de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas	NO APROBADO	Dic-21	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/DICT.-032-DETS-2021.pdf.	NO APROBADO	Dic-21	https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1357922/dict-32dets2021documento-ad-hoc-daratumumab.pdf			
Adultos mayores de 65 años con leucemia mieloide aguda recién diagnosticada y con comorbilidades que impiden el uso de terapia intensiva	Venetoclax 100mg	Tableta	Azacitidina	En combinación con azacitidina o citarabina a dosis bajas para el tratamiento de leucemia mieloide aguda recién diagnosticada y con comorbilidades que impiden el uso de terapia intensiva	NO EVALUADO			NO APROBADO	Dic-21	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/DICT.-037-DETS-2021.pdf			
Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, metastásico, con ECOG 0-2 y que han progresado a quimioterapia y a un inhibidor de ALK de primera generación	ALECTINIB 150 mg	Cápsula	Quimioterapia basada en platino	TRATAMIENDO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO (CPNM) METASTÁSICO POSITIVO PARA EL RE ARREGLO DE LA CINASA DEL LINFOMA ANAPLASICO (ALK) (Segunda línea)	NO APROBADO			NO APROBADO	Dic-21	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/DICT.-039-DETS-2021_compressed.pdf			
Pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda philadelphia positivo resistente o intolerante a quimioterapia más imatinib.	Dasatinib 50mg	Tableta	Quimioterapia	Tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda philadelphia positivo resistente o intolerante a quimioterapia más imatinib.				NO APROBADO	Dic-21	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/DICT.-038-DETS-2021.pdf			
Pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, metastásico, con ECOG 0-2 y que progresa a quimioterapia	Crizotinib 250mg	Tableta	Quimioterapia	Tratamiento cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, metastásico, con ECOG 0-2 y que progresa a quimioterapia				NO APROBADO	Dic-21	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/DICT.-043-DETS-2021_compressed.pdf			
Pacientes adultos con diagnóstico de linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario a 3 líneas o más de terapia sistémica incluyendo trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos	NIVOLUMAB 100 mg / mL	Inyectable	quimioterapia	Tratamiento de linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario a 3 líneas o más de terapia sistémica incluyendo trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos				NO APROBADO	Abr-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/DICT.-017-DETS-2022.pdf			
Pacientes adultos con melanoma maligno metastásico o irresecable que progresa a dos líneas de quimioterapia, con ECOG 0-1	NIVOLUMAB 100 mg / mL	Inyectable	quimioterapia	Tratamiento de pacientes adultos con melanoma maligno metastásico o irresecable que progresa a dos líneas de quimioterapia, con ECOG 0-1				APROBADO	Oct-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/DICT.-039-DETS-2022.pdf			

Paciente adulto con diagnóstico de cáncer de piel de células escamosas con enfermedad metastásica.	PEMBROLIZUMAB 100 mg / 4 mL	Concentrado para solución para perfusión	Mejor terapia de soporte	Tratamiento de cáncer de piel de células escamosas con enfermedad metastásica.				NO APROBADO	Oct-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/DICT.-037-DETS-2022.pdf			
Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B con cromosoma Philadelphia negativo en recidiva o refractaria	Blinatumumab	Inyectable	Quimioterapia	Tratamietno de leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B con cromosoma Philadelphia negativo en recidiva o refractaria				NO APROBADO	Ago-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/DICT.-032-DETS-2022_compressed.pdf			
Pacientes adultos con pénfigo vulgar moderado a severo refractario o no tributario a tratamiento convencional con agentes inmunosupresores y corticoides sistémicos	Rituximab 500mg/50ml	Inyectable	Mejor terapia de soporte	Pénfigo vulgar moderado a severo refractario o no tributario a tratamiento convencional con agentes inmunosupresores y corticoides sistémicos				APROBADO	May-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/DICT.-023-DETS-2022_compressed.pdf			
Pacientes con cáncer de ovario, de trompas de Falopio, o peritoneal primario, recurrente, sensible a la quimioterapia basado en platino	OLAPARIB 150 mg	Tableta	Mejor terapia de soporte	Tratamiento cáncer de ovario, de trompas de Falopio, o peritoneal primario, recurrente, sensible a la quimioterapia basado en platino				NO APROBADO	Abr-22	https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/DICT.-019-DETS-2022_compressed.pdf			