




























POBLACIÓN	INDICACIONES	F.F.	COMPARADOR	INDICACIÓN INFORME ETS	DIGEMID L.C.	FECHA DIGEMID	PDF	IETSI	FECHA IETSI	PDF	RENETSA	FECHA RENETSA	PDF
Hepatitis crónica por virus hepatitis C que han recibido terapia dual con peginterferon alfa y ribavirina	Telaprevir	Tableta	Regimen sin Telaprevir	Hepatitis crónica por virus hepatitis C que han recibido terapia dual con peginterferon alfa y ribavirina	NO EVALUADO			APROBADO	19-Jan-16		NO EVALUADO		
Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR)	Linezolid	Amp	Esquemas sin linezolid	Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR)	NO EVALUADO			APROBADO	03-Feb-16		NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con amfotericina B	Posaconazol	Amp	Amfotericina B	Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con amfotericina B	NO EVALUADO			APROBADO	24-Oct-16		NO EVALUADO		
Adultos con candidemia o candidiasis invasiva no neutropénicos con respuesta inadecuada o reacciona adversa a fluconazol.	Anidulafungina	Polvo liofilizado para solución inyectable	Caspofungina	Adultos con candidemia o candidiasis invasiva no neutropénicos con respuesta inadecuada o reacciona adversa a fluconazol.	NO EVALUADO			APROBADO	28-Oct-16		NO EVALUADO		
Dolor crónico oncológico moderado a severo que no toleran otro tratamiento analgésico por vía oral, vía endovenosa o vía subcutánea	Buprenorfina parche transdérmico	Parche	Placebo Oxicodona Morfina Tramadol Petidina	Dolor crónico oncológico moderado a severo que no toleran otro tratamiento analgésico por vía oral, vía endovenosa o vía subcutánea	NO EVALUADO			APROBADO	31-Dec-16		NO EVALUADO		
Paciente pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica P refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas y tratamiento tópico	Colestiramina	Concentrado para solución para perfusión	Placebo	Paciente pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica P refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas y tratamiento tópico	NO EVALUADO			APROBADO	14-Feb-18		NO EVALUADO		
Pacientes con dolor neuropático crónico severo, refractario o intolerante a tratamiento convencional físico y farmacológico	Tapentadol liberación prolongada	Comprimidos	Terapia de soporte (bloqueo neurológico)	Pacientes con dolor neuropático crónico severo, refractario o intolerante a tratamiento convencional físico y farmacológico	NO EVALUADO			APROBADO	06-Jun-18		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con aspergilosis invasiva y con falla o intolerancia a voriconazol oral y posaconazol oral	Isavuconazol	Amp	Itraconazol oral	Pacientes adultos con aspergilosis invasiva y con falla o intolerancia a voriconazol oral y posaconazol oral	NO EVALUADO			NO APROBADO	13-Oct-20		NO EVALUADO		
Pacientes varones con insuficiencia cardiaca crónica con fracción de eyección reducida, clase funcional II-IV NYHA y recibiendo terapia médica óptima y que presentan ginecomastia con mastodinia debido al uso de espironolactona	Eplerenona	Tableta	Espironolactona	Pacientes varones con insuficiencia cardiaca crónica con fracción de eyección reducida, clase funcional II-IV NYHA y recibiendo terapia médica óptima y que presentan ginecomastia con mastodinia debido al uso de espironolactona	NO EVALUADO			APROBADO	05-Jan-22		NO EVALUADO		
Síndrome de intestino corto dependientes de nutrición parenteral	teduglutida	Concentrado para solución para perfusión	Placebo, cuidado estandar	síndrome de intestino corto dependientes de nutrición parenteral	NO APROBADO	14/01/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes de 0-18 años con resección ileal por cualquier causa.	Colestiramina	Concentrado para solución para perfusión	Placebo, colestipol, colesevelam	Pacientes de 0-18 años con resección ileal por cualquier causa.	NO APROBADO	14/01/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes con cáncer de mama con depresión moderada a severa	Desvenlafaxina+tamoxifeno	Comprimidos	Tamoxifeno y otro antidepressivo	Pacientes con cáncer de mama con depresión moderada a severa	APROBADA	07/02/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos (0-18 años) con diagnóstico de encefalitis autoinmune	Inmunoglobulina humana	frasco	Corticosteroides	Pacientes pediátricos (0-18 años) con diagnóstico de encefalitis autoinmune	NO APROBADO	14/08/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafil en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentán	Macitentan	Tableta	Sildenafil	Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafil en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentán	NO EVALUADO			APROBADO	30-Sep-22		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el período perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular	Óxido nítrico	Comprimidos	Mejor terapia de soporte o Placebo	Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el período perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular	NO EVALUADO			APROBADO	26-Oct-22		NO EVALUADO		

Pacientes adultos con mucormicosis e intolerancia o contraindicación a amfotericina B deoxicolato	Amfotericina B liposomal	Amp	Mejor terapia de soporte	Pacientes adultos con mucormicosis e intolerancia o contraindicación a amfotericina B deoxicolato	NO EVALUADO			APROBADO	14-Oct-22		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas	Ceftazidima-avibactam	Amp	Colistina	Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas	NO EVALUADO			APROBADO	01/11/2022		NO EVALUADO		
Pacientes mayores de 18 años con fibrosis quística	Dornasa alfa, diaria	Amp	Solución salina hipertónica (SSH) o dornasa alfa en administración interdiaria	Pacientes mayores de 18 años con fibrosis quística	NO EVALUADO			NO EVALUADO			NO APROBADO	16/11/2022	
Personas con TB/VIH adultos (personas que reciben esquema para TB sensible) sin tratamiento antirretroviral previo	Dolutegravir 100 mg/día	Tableta	Dolutegravir 50 mg/día	Personas con TB/VIH adultos (personas que reciben esquema para TB sensible) sin tratamiento antirretroviral previo	NO APROBADO	31/12/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes adultos críticos sépticos sometidos a cirugías que requieran sustitución de pérdida de fluidos extracelulares	Solución isotónica balanceada	frasco	Solución salina L-HES	Pacientes adultos críticos sépticos sometidos a cirugías que requieran sustitución de pérdida de fluidos extracelulares	NO EVALUADO			NO APROBADO	04/07/2023		NO EVALUADO		
Pacientes con diagnóstico de Hemofilia A	Emicizumab	vial	Complejo Protrombitico activado o Factor VII recombinante	Pacientes con diagnóstico de Hemofilia A, con presencia de anticuerpos inhibidores del Factor VIII, que fracasaron o no eran candidatos a la terapia con inmunoterapia con Factor VIII	NO EVALUADO			APROBADO	04/07/2023		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con bacteriemia debido a infección de herida operatoria por enterobacterias productoras de carbapenemasas	Ceftazidima-avibactam	Amp	Mejor antibiotico disponible	Pacientes adultos con bacteriemia debido a infección de herida operatoria por enterobacterias productoras de carbapenemasas	NO EVALUADO			APROBADO	10/07/2023		NO EVALUADO		
pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes de corticoides	Fotoféresis extracorpórea con metoxaleno	vial	Micofenolato, rituximab	pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes de corticoides	NO EVALUADO			NO EVALUADO			APROBADO	21/08/2023	
Anemia aplásica severa adquirida, sin donante HLA idéntico, candidato a terapia inmunosupresora (globulina antitimocítica y ciclosporina)	Eltrombopag	tableta	Terapia inmunosupresora en primera linea de tratamiento	Anemia aplásica severa adquirida, sin donante HLA idéntico, candidato a terapia inmunosupresora (globulina antitimocítica y ciclosporina)	NO EVALUADO			NO APROBADO	13/09/2023		NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos* con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado a X**, portador de deformidades óseas severas***, con el esqueleto en crecimiento	Burosumab	frasco	Mejor terapia de soporte	Pacientes pediátricos* con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado a X**, portador de deformidades óseas severas***, con el esqueleto en crecimiento y no responder al tratamiento con calcitriol y suplementos de fosfato	NO EVALUADO			NO APROBADO	22/09/2023		NO EVALUADO		

Pacientes hospitalizados con desnutrición leve o moderada	Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalórico	frasco	Suplemento nutricional oral normoproteico y normocalorico	Pacientes hospitalizados con desnutrición leve o moderada	NO EVALUADO			NO APROBADO	27/09/2023		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con infección por bacterias gramnegativas productoras de carbapenemasas	Ceftazidima-Avibactam	polvo concentrado para solución inyectable	Mejor tratamiento antibiotico disponible	Pacientes adultos con infección por bacterias gramnegativas productoras de carbapenemasas	NO EVALUADO			APROBADO	10/11/2023		NO EVALUADO		
Pacientes neonatos e infantes que requieran manejo del dolor moderado postoperatorio.	Paracetamol	Solución para perfusión	Mejor terapia de Soporte	Pacientes neonatos e infantes que requieran manejo del dolor moderado postoperatorio.	NO EVALUADO			NO APROBADO	10/11/2023		NO EVALUADO		